Terroirs de Bordeaux

J-Ph ROBY, ENITA de Bordeaux
1 crs du Général de Gaulle
33170 Gradignan
(UMR (Enologie-Ampélogie))
Contact: jp-roby@enitab.fr

Definizione di terroir

- Il terroir è l'associazione di fattori biologici (la vite), di fattori fisici (geologia, topografia, pedologia, climatologia) e di fattori umani (pratiche agronomiche, usi locali).

1) Le basi agronomiche della delimitazione dei terroirs

- L'uomo rivela le potenzialità dei terreni e dei terroirs (dati storici)
- Il clima
- La topografia
- Selezione dei vitigni e portainnesti
- Il suolo e il sottosuolo

Questi fattori sono indissociabili per definire un terroir. Il viticoltore non può modificare il clima, la topografia e il sottosuolo. Invece li seleziona.

Il fattore pedologico : a livello di un AOC. Es. di St-Emilion

- Il vino di St-Emilion è una entità riconosciuta per il suo terroir
- Questo terroir si trova su una vasta gamma di tipi pedologici
- Le particelle dei grands crus sono distribuite sull'insieme delle unità pedologiche
- Non esiste dunque una sola formazione geologica di cui si possa affermare che è un fattore indiscutibile e esclusivo della qualità di un vino.

Il fattore pedologico a livello dell'azienda viticola

- 28 ettari di un solo tenentario nel terroir delle graves di Pessac-Léognan
- Delle ghiaie e sabbie sparse su tutta la superficie che mascherano delle unità pedologiche contrastanti
- Una definizione del contorno delle particelle delicate che non può tenere conto di questo solo fattore

Il fattore pedologico : scala particellare nelle Premières Côtes de Bordeaux

- Dei suoli molto diversi su una particella di due ettari che generano delle differenze di comportamento della vite
- Il viticoltore deve dunque adattare il suo materiale vegetale a queste differenti unità pedologiche

L'estrema diversità dei suoli

- Il tener conto della diversità pedologica di un'azienda si traduce in :
 - una nuova suddivisione particellare in occasione di ristrutturazione di vigneti
 - vendemmie distinte (date scaglionate) in una stessa particella
 - trattamenti differenziati dell'uva proveniente da una stessa particella

Il clima a livello regionale

Somma delle temperature attive

- Il vigneto di Bordeaux è caratterizzato da temperature miti alla fioritura e per la vendemmia
- Le differenze intra-regionali sono poco marcate (100° max.)

Il clima a livello regionale

Cumuli annuali delle precipitazioni

- Una pluviometria più contrastata, da 750 mm a 1000 mm all'anno.
- Delle differenze che permettono d'isolare delle piccole regioni climaticamente
- ➔ Sulla riva sinistra della Garonna, la regione delle Graves è più calda e umida del resto dell'appellazione.

Il topoclima a livello dell'azienda

- La topografia del vigneto determina la variabilità dei microclimi particellari
- L'esposizione delle particelle in pendenza è determinante
- Il gelo di primavera modifica spesso la logica dei vitigni delle particelle gelive
- L'atmosfera più umida di particelle incassate provoca dei danni sanitari che nuociono alla qualità del prodotto
- ➔ Le date di raccolta tengono conto del topoclima